



Les Jardiniers du Val d'Authion vous ont proposé un atelier :

## Faire ses boutures (pépinières, vivaces, herbacées....)

Animé par M Gérard Tardif enseignant au CNPH de la Ménitré.

### Compte rendu Atelier BOUTURAGE

Le 03 mai 2025

Il existe **3 saisons** pour bouturer :

**1 : au printemps** : d'avril à juin, c'est les boutures des herbacées, réservées aux arbustes à feuillage caduc (qui perdent leurs feuilles) sur les pousses de l'année.

- **2 : en automne** : de septembre à novembre, réservé aux arbustes à feuillage persistant.
- **3 : en hiver** : de décembre à février-mars, réservé aux boutures des ligneux : bois avec écorce (ex : figuier) ou boutures à « bois sec » à feuillage caduc aussi.

Les boutures donnent des **plantes identiques génétiquement** à celles que vous avez bouturées (ce sont des clones). Elles auront les mêmes couleurs pour les fleurs par exemple que la plante mère (celle qui est prélevée), contrairement aux graines que vous plantez qui sont issues d'un croisement et qui donc peuvent donner des fleurs à couleurs différentes.

1 : Pour les **boutures du printemps**, faire les **boutures herbacées** dans la journée :

- Couper à la fraîche, le matin, sous le nœud, sous les yeux, **quelques millimètres** en dessous. Les yeux (les bourgeons) empêchent la pourriture de la tige. Enlever les feuilles à ce niveau.
- Laisser un entrenœud et couper au-dessus des feuilles (1 cm minimum).
- Mettre dans du terreau : enfoncer environ d'un tiers.
- Couper l'extrémité des feuilles pour limiter l'évapotranspiration des feuilles.
- Vaporiser le feuillage et recouvrir d'un plastique (sac de congélation ou arceaux en plastique s'il y a beaucoup de boutures).
- Eviter de mettre les plants en plein soleil, contre les coups de soleil, mettre les plants plutôt mi-ombre et toile dessus à la mi-journée pour éviter un trop fort ensoleillement, à enlever le soir.
- Tous les jours, aérer les boutures : eau à enlever car le terreau ne doit pas être trop humide, sinon la plante pourrit. Ensuite, lorsque la bouture a bien démarré, enlever le plastique.

## 2 : Pour les **boutures semi-ligneuses** : (automne)

- Même procédé mais avec des boutures plus grandes 8 à 10 cm.
- Enlever les fleurs, les feuilles en surnombre
- à l'opposé d'un œil enlever un bout d'écorce avec l'œil qui s'y trouve, cela favorise l'enracinement sur le côté blessé.
- Pour remplacer les hormones de bouturage qui ne sont plus vendues au particulier on peut faire tremper des branches d'un saule 48h et tremper la base des boutures dans l'eau avant de les mettre dans le terreau.
- Les Rhododendrons, les Camélias et les conifères sont en général difficiles à bouturer.

## 3 : Pour les **boutures ligneuses** : (hiver)

- Couper sous un œil et laisser 20 cm environ au-dessus (bouture encore plus grande).
- Enterrer de moitié.
- Mettre dans de la terre aérée, sablonneuse, pas de terre lourde SVP.
- Il faut être patient plusieurs mois avant de voir le résultat.

Autre type de boutures : **les boutures de feuilles** sur les Bégonias, Saintpaulias, Kalanchoés :

- Découper la feuille en lanières de 1 à 2 cm, perpendiculairement à la forme de la feuille
- Déposer sur du terreau drainant, à plat
- Pulvériser de l'eau régulièrement et c'est tout !!!

Pour les kiwis, il faut un mâle pour 8 femelles car c'est une plante dioïque (pieds avec fleurs mâles et pied avec fleurs femelles séparés). Se bouture comme les semi-ligneux.

Les glycines ne se bouturent pas, par contre les marcottes sont tout à fait possibles.

Remarque (hors sujet) : Pour la rhubarbe, ne pas jeter les feuilles, les garder et les mettre sur les mauvaises herbes du jardin, ce sont des désherbants naturels (contiennent des substances toxiques).